

Anno 2020						
COMUNI ricompresi nella regione agraria n.1: <ul style="list-style-type: none"> • ARVIER • AVISE • COURMAYEUR • LA SALLE • LA THUILE • MORGEX • PRE-SAINT-DIDIER • VALGRISENCHE 						
TIPI DI COLTURA		≤1000	1001/1250	1251/1500	1501/1800	oltre 1800
Vigneto	V	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Frutteto specializzato/orto	F_Oi	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
Prato arborato irriguo	Prai	6,29	5,55	5,26	5,26	5,26
Seminativo arborato irriguo	Sai	-	-	-	-	-
Prato irriguo	Pri	5,24	4,63	4,39	3,67	3,67
Seminativo irriguo	Si	-	-	-	-	-
Prato asciutto	Pr	4,25	4,04	3,84	3,23	1,08
Prato arborato asciutto	Pra	4,61	4,10	3,89	2,48	2,48
Seminativo asciutto	S	4,03	3,56	3,37	3,37	3,37
Seminativo arborato asciutto	Sa	4,27	3,77	3,57	3,57	3,57
Castagneto	C	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bosco alto fusto	Ba	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Bosco ceduo	Bc	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Bosco misto	Bm	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Pascolo	P	3,19	2,79	2,65	2,06	0,88
Pascolo cespugliato (magro)	Pc	1,24	1,19	1,13	0,88	0,23
Incolto produttivo	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Incolto sterile	Is	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

* Nella remota ipotesi di coltura ricompresa in una fascia altimetrica per la quale non è stato determinato il relativo Vam, si applica quello della fascia altimetrica immediatamente precedente.

* Qualora il terreno fosse ricompreso in due fasce altimetriche, si terrà conto del valore della superficie prevalente.

Anno 2020						
COMUNI ricompresi nella regione agraria n.2: • ALLEIN • BIONAZ • DOUES • ETROUBLES • OLLOMONT • OYACE • SAINT-OYEN • SAINT-RHEMY • VALPELLINE						
TIPI DI COLTURA		≤ 1000	1001/1250	1251/1500	1501/1800	oltre 1800
Vigneto	V	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
Frutteto specializzato/orto	F_Oi	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Prato arborato irriguo	Prai	6,29	5,53	4,83	4,83	4,83
Seminativo arborato irriguo	Sai	5,64	4,96	4,33	3,67	3,67
Prato irriguo	Pri	5,21	4,56	4,00	2,95	2,95
Seminativo irriguo	Si	5,10	4,48	3,92	3,32	3,32
Prato asciutto	Pr	4,24	3,41	3,18	2,73	1,07
Prato arborato asciutto	Pra	4,60	4,05	4,05	4,05	4,05
Seminativo asciutto	S	4,05	3,56	3,37	3,37	3,37
Seminativo arborato asciutto	Sa	-	-	-	-	-
Castagneto	C	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bosco alto fusto	Ba	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Bosco ceduo	Bc	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Bosco misto	Bm	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Pascolo	P	3,19	2,81	2,66	2,07	0,89
Pascolo cespugliato (magro)	Pc	1,26	1,19	1,13	0,88	0,23
Incolto produttivo	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Incolto sterile	Is	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

* Nella remota ipotesi di coltura ricompresa in una fascia altimetrica per la quale non è stato determinato il relativo Vam, si applica quello della fascia altimetrica immediatamente precedente.

* Qualora il terreno fosse ricompreso in due fasce altimetriche, si terrà conto del valore della superficie prevalente.

<p align="center">Anno 2020</p> <p><i>COMUNI ricompresi nella regione agraria n.3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • AOSTA • CHARVENSOD • GIGNOD • JOVENÇAN • POLLEIN • ROISAN • SAINT-CHRISTOPHE • BRISSOGNE • FENIS • GRESSAN • NUS • QUART • SAINMARCEL • SARRE 						
TIPI DI COLTURA		≤ 1000	1001/1250	1251/1500	1501/1800	oltre 1800
Vigneto	V	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
Frutteto specializzato/orto	F_Oi	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48
Prato arborato irriguo	Prai	6,31	5,58	5,29	5,29	5,29
Seminativo arborato irriguo	Sai	5,66	5,00	4,74	3,96	3,96
Prato irriguo	Pri	5,24	4,63	4,39	3,67	3,67
Seminativo irriguo	Si	5,05	4,46	4,23	3,54	3,54
Prato asciutto	Pr	4,27	3,72	3,54	2,50	1,06
Prato arborato asciutto	Pra	4,62	4,36	4,36	4,36	4,36
Seminativo asciutto	S	4,05	3,58	3,39	3,39	3,39
Seminativo arborato asciutto	Sa	4,27	3,77	3,58	3,58	3,58
Castagneto	C	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bosco alto fusto	Ba	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Bosco ceduo	Bc	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Bosco misto	Bm	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Pascolo	P	2,94	2,77	2,63	2,06	0,89
Pascolo cespugliato (magro)	Pc	1,25	1,19	1,13	0,88	0,23
Incolto produttivo	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Incolto sterile	Is	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

* Nella remota ipotesi di coltura ricompresa in una fascia altimetrica per la quale non è stato determinato il relativo Vam, si applica quello della fascia altimetrica immediatamente precedente.

* Qualora il terreno fosse ricompreso in due fasce altimetriche, si terrà conto del valore della superficie prevalente.

Anno 2020						
COMUNI ricompresi nella regione agraria n. 5 :						
• AYAS • ARNAD • BRUSSON • CHALLAND -SAINT -ANSELME • CHALLAND -SAINT -VICTOR • CHAMPDEPRAZ • EMARESE • ISSOGNE • MONTJOVET • SAINT -VINCENT • VERRES						
TIPI DI COLTURA		≤ 1000	1001/1250	1251/1500	1501/1800	oltre 1800
Vigneto	V	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89
Frutteto specializzato/orto	F_Oi	7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
Prato arborato irriguo	Prai	6,28	5,98	5,68	5,68	5,68
Seminativo arborato irriguo	Sai	5,63	5,36	5,09	3,67	3,67
Prato irriguo	Pri	5,23	4,98	4,73	3,41	3,41
Seminativo irriguo	Si	5,07	4,83	4,59	3,31	3,31
Prato asciutto	Pr	3,93	3,73	3,52	2,74	1,27
Prato arborato asciutto	Pra	4,28	4,05	3,86	3,86	3,86
Seminativo asciutto	S	4,02	3,83	3,64	3,64	3,64
Seminativo arborato asciutto	Sa	4,26	4,06	3,85	3,85	3,85
Castagneto	C	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bosco alto fusto	Ba	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Bosco ceduo	Bc	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Bosco misto	Bm	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Pascolo	P	2,94	2,79	2,66	2,07	0,89
Pascolo cespugliato (magro)	Pc	1,26	1,19	1,14	0,88	0,23
Incolto produttivo	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Incolto sterile	Is	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

* Nella remota ipotesi di coltura ricompresa in una fascia altimetrica per la quale non è stato determinato il relativo Vam, si applica quello della fascia altimetrica immediatamente precedente.

* Qualora il terreno fosse ricompreso in due fasce altimetriche, si terrà conto del valore della superficie prevalente.

Anno 2020						
COMUNI ricompresi nella regione agraria n.7 •AYMAVILLES •COGNE •INTROD •RHEMESNOTRE-DAMES •RHEMES- SAINT-GEORGES •SAINT-NICOLAS •SAINT-PIERRE •VILLENEUVE •VALSAVARENCHÉ						
TIPI DI COLTURA		≤ 1000	1001/1250	1251/1500	1501/1800	oltre 1800
Vigneto	V	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94
Frutteto specializzato/orto	F_Oi	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48
Prato arborato irriguo	Prai	6,26	5,52	5,24	5,24	5,24
Seminativo arborato irriguo	Sai	5,62	4,95	4,70	3,94	3,94
Prato irriguo	Pri	5,22	4,60	4,37	3,66	3,66
Seminativo irriguo	Si	5,06	4,46	4,24	3,55	3,55
Prato asciutto	Pr	3,93	3,43	3,22	2,73	1,07
Prato arborato asciutto	Pra	4,60	3,46	3,46	3,46	3,46
Seminativo asciutto	S	4,02	3,54	3,37	3,37	3,37
Seminativo arborato asciutto	Sa	4,26	3,75	3,57	3,57	3,57
Castagneto	C	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Bosco alto fusto	Ba	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Bosco ceduo	Bc	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Bosco misto	Bm	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Pascolo	P	2,93	2,82	2,63	2,06	0,89
Pascolo cespugliato (magro)	Pc	1,25	1,19	1,12	0,88	0,38
Incolto produttivo	I	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Incolto sterile	Is	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

* Nella remota ipotesi di coltura ricompresa in una fascia altimetrica per la quale non è stato determinato il relativo Vam, si applica quello della fascia altimetrica immediatamente precedente.

* Qualora il terreno fosse ricompreso in due fasce altimetriche, si terrà conto del valore della superficie prevalente.